



Uitspoelconcentraties en persistentie van antibiotica in de bodem berekend met het GeoPEARL 3.3.3 model

Een oriënterende studie

J. Lahr
F. van den Berg

Alterra-rapport 1922, ISSN 1566-7197



Uitspoelconcentraties en persistentie van antibiotica in de bodem berekend met het GeoPEARL 3.3.3 model

Dit onderzoek is gedaan in opdracht van het Ministerie van LNV, in het kader van het beleidsondersteunend onderzoek, programma Vitaal Landelijk Gebied, Thema Bodem (BO-01-002), en in opdracht van het Ministerie van VROM. Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het project 'Antibiotica in de bodem' van de Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB) met als penvoerder adviesbureau Geofox-Lexmond.

Projectcode BO-01-002-206

Uitspoelconcentraties en persistentie van antibiotica in de bodem berekend met het GeoPEARL 3.3.3 model

Een oriënterende studie

J. Lahr
F. van den Berg

Alterra-rapport 1922

Alterra, Wageningen, 2009

REFERAAT

Lahr, J. & F. van den Berg, 2009. *Uitspoelconcentraties en persistentie van antibiotica in de bodem berekend met het GeoPEARL 3.3.3 model. Een oriënterende studie.* Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 1922. 29 blz.; 1 fig.; 5 tab.; 21 ref.

Bij de milieubeoordeling van diergeneesmiddelen wordt door voor het afleiden van de lotgevallen in bodem en grondwater modelstudies voorgesteld. Recent is voor gewasbeschermingsmiddelen een nieuwe versie van het model GeoPEARL uitgebracht, v3.3.3. Hiermee kan men ook de persistentie in de toplaag van de bodem beoordelen. Er is een korte oriënterende studie uitgevoerd om na te gaan in hoeverre dit model ook kan worden gebruikt voor het modelleren van de lotgevallen van antibiotica. Hiertoe werden vier antibiotica geselecteerd: oxytetracycline, sulfamethoxazol, sulfadiazine en trimethoprim. De studie wijst uit dat GeoPEARL 3.3.3 in principe geschikt is voor diergeneesmiddelen, maar nog wel enkele aanpassingen behoeft. De bottleneck bij het gebruik van het model is het vinden van betrouwbare fysische en chemische eigenschappen voor diergeneesmiddelen.

Trefwoorden: Antibiotica, Bodem, Uitspoeling, Persistentie, Model, GeoPEARL

ISSN 1566-7197

Dit rapport is gratis te downloaden van www.alterra.wur.nl (ga naar 'Alterra-rapporten'). Alterra verstrekt geen gedrukte exemplaren van rapporten. Gedrukte exemplaren zijn verkrijgbaar via een externe leverancier. Kijk hiervoor op www.boomblad.nl/rapportenservice.

© 2009 Alterra
Postbus 47; 6700 AA Wageningen; Nederland
Tel.: (0317) 480700; fax: (0317) 419000; e-mail: info.alterra@wur.nl

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alterra.

Alterra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

Inhoud

Woord vooraf	7
Samenvatting	9
1 Inleiding	11
2 Methoden	13
2.1 Selectie antibiotica	13
2.2 Vrachten naar de bodem	13
2.3 Stofeigenschappen	15
2.4 GeoPEARL berekeningen	16
3 Resultaten	19
3.1 Uitspoeling naar grondwater	19
3.2 Persistentie in bodem & poriewater	19
4 Discussie & conclusies	21
Literatuur	25
Bijlage 1 Stofeigenschappen van geselecteerde antibiotica	27
Bijlage 2 Beschrijving van de uitgevoerde GeoPEARL 3.3.3 berekeningen	29

Woord vooraf

Dit rapport is opgesteld in opdracht van het Ministerie van LNV, in het kader van het beleidsondersteunend onderzoek, programma Vitaal Landelijk Gebied, Thema Bodem (BO-01-002), en het Ministerie van VROM. Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het project ‘Antibiotica in de bodem’ van de Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem met als penvoerder adviesbureau Geofox-Lexmond in Tilburg. De studie werd uitgevoerd door Dr. ir. Joost Lahr van Alterra, Wageningen UR (Centrum Ecosystemen), en Dr. Erik van den Berg van Alterra, Wageningen UR (Centrum Water en Klimaat). Contactpersonen namens het Ministerie van LNV waren Jan Huinink (Directie Kennis & Innovatie, Team Leefomgeving) en Johan de Jong (Directie Natuur, Landschap & Platteland). De contactpersonen bij het Ministerie van VROM waren Sybren Landman en Maartje Nelemans. Met dank aan Nico van den Brink van Alterra, Wageningen UR, en Ton van der Linden, RIVM, voor commentaar op de conceptversie.

Samenvatting

Bij de milieubeoordeling van diergeneesmiddelen worden door de voor de registratie verantwoordelijke instanties voor het afleiden van de lotgevallen (gedrag en persistentie) in bodem en grondwater modelstudies voorgesteld. In Nederland zijn de afgelopen jaren modellen ontwikkeld waarmee men de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater kan beoordelen. Recent is voor dit doel een nieuwe versie van het model GeoPEARL 3.3.3 uitgebracht. Hiermee kan men ook de persistentie in de toplaag van de bodem beoordelen. Door Alterra is een korte oriënterende studie uitgevoerd om na te gaan in hoeverre dit model ook kan worden gebruikt voor het modelleren van de lotgevallen van antibiotica. De studie betrof het opzoeken en invoeren van gegevens en het doorrekenen van enkele scenario's, maar nog geen validatie van de resultaten van de modelvoorspellingen door toetsing aan meetgegevens.

Er werden op basis van hun gebruik in Nederland vier antibiotica geselecteerd: oxytetracycline, sulfamethoxazol, sulfadiazine en trimethoprim. Voor deze stoffen werden de fysische en chemische eigenschappen uit de literatuur verzameld voor invoer in het model. Het bleek voor deze stoffen en ook voor enkele andere diergeneesmiddelen lastig om goede gegevens te vinden in de openbare literatuur. Voor de modellering werd een aantal scenario's opgesteld voor een voorjaarstoediening via mest aan maïsakkers. De scenario's verschilden in realisme (realistisch versus een 'worst case') en in toedieningswijze (diepte van de toediening, inwerken versus injecteren).

De berekende uitspoelconcentraties waren allen laag voor de realistische scenario's. Oxytetracycline, sulfamethoxazol en sulfadiazine spoelen volgens de berekeningen niet uit, trimethoprim in een lage concentratie. Trimethoprim spoelt aanzienlijk meer uit onder extreme 'worst case' omstandigheden (langere halfwaardetijd, hoge vracht). De uitspoelconcentraties lagen bij het realistische scenario echter onder de Europese drempelconcentratie van 0.1 µg/L voor grondwater.

Qua persistentie zijn met GeoPEARL de bodem- en poriewater concentraties 2 jaar en 7 jaar na stoppen van een jaarlijkse toediening gedurende 20 jaar bepaald. Sulfamethoxazol en sulfadiazine komen na 2 jaar niet meer voor in de bodem en het poriewater. Oxytetracycline is persistenter en zou volgens de modelberekeningen na 2 jaar nog in de bodem aanwezig zijn maar niet in het poriewater. Trimethoprim, ten slotte, is van de stoffen het meest persistent. In de realistische scenario's is deze stof 7 jaar na stoppen van de jaarlijkse toedieningen echter ook verdwenen uit de toplaag.

Trimethoprim behoeft meer aandacht in risicoanalyses en bij monitoring. Het spoelt van de vier middelen het meeste uit en is persistent. Ook wordt het middel in combinatie met verschillende andere antibiotica gebruikt waardoor de totale vracht naar het milieu groter zal zijn dan op basis van het gebruik van één soort medicijn.

Voor alle berekende parameters geldt dat er geen grote verschillen waren tussen de drie doorgerkende realistische toedieningsscenario's: inwerken over 5 cm, inwerken over 15 cm en injecteren op 15 cm.

De uitkomst van de GeoPEARL berekeningen staat of valt met de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens om in het model in te voeren. Op basis van deze studie mag echter geconcludeerd worden dat, indien er goede invoergegevens beschikbaar zijn, GeoPEARL in principe gebruikt kan worden voor het modelleren van de lotgevallen van diergeneesmiddelen ten behoeve van de risicobeoordeling voor registratiedoelinden. Er kunnen verschillende relevante scenario's voor diergeneesmiddelen worden doorgerkend. Het model zou in de toekomst kunnen worden ingezet bij het bepalen van gebieden met de hoogste risico's ('hot spots'), het ontwerpen van monitoringsprogramma's en het afleiden van vuistregels voor de toediening van de middelen aan de dieren en van mest aan de bodem. Het is echter wel nodig om voor diergeneesmiddelen de invoer en uitvoer van het model op een aantal punten aan te passen:

- *Invoer van het model*
 - Er moet vóór het invoeren van gegevens in GeoPEARL met de lotgevallen van de diergeneesmiddelen in mestkelders rekening worden gehouden.
 - In principe zouden alleen berekeningen uitgevoerd moeten worden voor plots waar de middelen ook echt terecht komen. Hiertoe moet voor mest de koppeling met het gewas gedeeltelijk worden losgelaten en een extra kaart worden geconstrueerd met gebieden waar mest uit een bepaalde veehouderijsector uitgereden wordt.
- *Modelaanpassingen.*
 - In het kader van realistische scenario's voor mest zouden mestinjectie en ploegen in combinatie doorgerkend moeten kunnen worden.
- *Uitvoer van het model.*
 - Uitvoer van de initiële concentraties ('PEC_{initial}') in de toplaag van de bodem en het poriewater direct na toediening van mest.
 - Uitvoer van de ophoping in de toplaag van de bodem gedurende de toedieningsperiode van diergeneesmiddelen.

Daarnaast is het belangrijk om de uitkomsten van het onderliggende PEARL model te toetsen middels onderzoek in het veld.

1 Inleiding

De afgelopen 10 jaar zijn in Europees en in mondiaal verband door respectievelijk de European Medicines Agency (EMA) en de International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products (VICH) richtlijnen opgesteld voor de risicobeoordeling van de milieueffecten van diergeneesmiddelen. De voorgestelde methodiek bestaat uit een Fase 1 en een Fase 2 (VICH, 2000, 2004). Fase 2 bestaat uit drie stappen of 'tiers', A, B en C, waarin steeds een nadere risicokarakterisering plaats vindt. Voor het afleiden van de lotgevallen (gedrag en persistentie) in het milieu worden hiertoe modelstudies voorgesteld (EMA, 2006). Deze dienen zich te richten op de voorspelling van de milieuconcentraties ('Predicted Environmental Concentrations', PEC's) in bodem, grondwater en oppervlaktewater. De VICH (2004) geeft hierbij expliciet aan dat de $PEC_{\text{grondwater}}$ moet worden afgeleid op een regionaal niveau.

In Nederland wordt sinds 1988 gebruik gemaakt van een beslisboom om het risico van uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het grondwater te kunnen beoordelen. De beoordeling heeft als criterium dat concentraties van werkzame stoffen en relevante metabolieten in het grondwater over een lange periode (20-60 jaar, afhankelijk van de toepassingsfrequentie) lager moeten zijn dan $0.1 \mu\text{g dm}^{-3}$, onder tenminste 90 % van het oppervlak waarop de stoffen worden gebruikt. Om deze concentraties te kunnen berekenen is het model GeoPEARL ontwikkeld (Tiktak et al., 2003, 2006). Daartoe zijn landsdekkende schematisaties gemaakt van o.a. bodemeigenschappen, landgebruik, meteorologie en drainagesystemen.

Recent is een nieuwe versie van het model uitgebracht, GeoPEARL 3.3.3 (van den Berg et al., 2008). Hiermee kan men van gewasbeschermingsmiddelen ook de persistentie in de toplaag van de bodem beoordelen. GeoPEARL 3.3.3 is in principe ook te gebruiken voor andere stoffen die op het land terecht komen zoals antibiotica, maar daar is nog weinig studie naar gedaan. Om deze reden is door Alterra een korte oriënterende studie uitgevoerd om na te gaan in hoeverre GeoPEARL 3.3.3 kan worden gebruikt voor het modelleren van de lotgevallen van antibiotica in bodem en grondwater.

Voor een beperkt aantal antibiotica zijn fysisch-chemische gegevens verzameld en aan verschillende toepassingsscenario's onderworpen. Voor de scenario's (vrachten naar de bodem) is gebruik worden gemaakt van de uitkomsten van de recente studie naar de risico's van diergeneesmiddelen in het terrestrische milieu door het CML (Tamis et al., 2008).

Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het project 'Antibiotica in de bodem' van de Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem. De keuze van de stoffen is tevens afgestemd met de andere onderdelen van het project - met name de metingen in bodem en grondwater - zodat de uitkomsten van de GeoPEARL berekeningen met de resultaten van dit onderzoek vergeleken kunnen worden.

2 Methoden

2.1 Selectie antibiotica

De selectie van de meest geschikte antibiotica voor de studie heeft plaats gevonden aan de hand van de studie van Tamis et al. (2008) en screening van de beschikbare stofgegevens voor invoer in GeoPEARL. Tamis et al. (2008) combineerden voor verschillende sectoren van de veehouderij openbare gegevens over de toediening van antibiotica aan landbouwhuisdieren, de omvang van de veestapel en de hoeveelheden aan akkers toegediende mest. Op deze wijze werd een indruk gekregen van de potentiële vrachten antibiotica naar de bodem als gevolg van het gebruik bij kalveren en koeien in de wei, zeugen en biggen, vleesvarkens en pluimvee. De meest gebruikte antibiotica zijn volgens deze berekeningen:

- Sulfamethoxazol
- Sulfadiazine
- Oxytetracycline
- Doxycycline
- Trimethoprim
- Benzylpenicilline
- Ampicilline
- Amoxicilline
- Flumequine

Voor deze groep stoffen is op internet en wetenschappelijke publicaties uitgebreid gezocht naar de benodigde stoffeigenschappen om in GeoPEARL in te voeren (zie §2.3). Het bleek dat deze gegevens voor de meeste stoffen zeer moeilijk te vinden waren. Uiteindelijk is voor slechts vier stoffen de benodigde minimuminformatie gevonden en ook bij deze gegevens zijn soms kanttekeningen te plaatsen (zie hoofdstuk 4). De vier stoffen waarmee de berekeningen konden worden uitgevoerd zijn oxytetracycline, sulfamethoxazol, sulfadiazine en trimethoprim. Het komt niet als een verrassing dat dit tevens enkele van de meest gebruikte, en dus ook meest bestudeerde, antibiotica uit de veehouderij betreft.

2.2 Vrachten naar de bodem

In Tabel 1 is te zien hoe uit de gegevens in het rapport van Tamis et al. (2008) de via de mest toegediende oppervlakedosis voor akkers wordt berekend. De hiervoor gebruikte formule luidt:

$$\text{Oppervlakedosis}(g_{\text{antibioticum}} / \text{ha} \cdot \text{jr}) = \frac{\text{Dosering}(mg_{\text{antibioticum}} / \text{kg}_{\text{dier}} \cdot \text{jr}) \times \text{Vracht}(kg_{\text{mest}} / \text{ha})}{\text{Mestproductie}(kg_{\text{mest}} / \text{kg}_{\text{dier}} \cdot \text{jr}) \times 1000}$$

Tabel 1. Berekening van de oppervlaktedoses antibiotica toegediend via dierlijke mest op basis van de gegevens van Tamis et al. (2008). De gegevens in de kolommen 'GeoPEARL voorjaar' en 'GeoPEARL worst case' zijn als input gebruikt voor de modelberekeningen in het rapport.

	Dosering (mg/kg dier.jr)	Mestproductie (kg/kg dier.jaar)	Concentratie mest (mg/kg)	Voorjaarsvracht mest (kg/ha)	Oppervlaktedosis (g/ha)	GeoPEARL voorjaar	Jaarvracht mest (kg/ha)	Oppervlaktedosis (g/ha)	GeoPEARL worst case
Oxytetracycline									
Kalveren & koeien	17.0	11.4	1.49	25000	37.3		90000	134.2	
Vleesvarkens	103.4	5.2	19.88	30000	596.5	600	40000	795.4	800
Zeugen & biggen	116.4	6.2	18.77	30000	563.2		40000	751.0	
Vleeskuikens	97.5	1.4	69.64	4500	313.4				
Trimet(h)oprim/sulfamethoxazol(e) (1:5)									
Kalveren & koeien	16.3	11.4	1.43	25000	35.7		90000	128.7	
Vleesvarkens	129.0	5.2	24.81	30000	744.2	120/620	40000	992.3	170/830
Zeugen & biggen	79.0	6.2	12.74	30000	382.3		40000	509.7	
Vleeskuikens	0.0	1.4	0.00	4500	0.0				
Trimet(h)oprim/sulfadiazine (1:5)									
Kalveren & koeien	0.0	11.4	0.00	25000	0.0		90000	0.0	
Vleesvarkens	23.8	5.2	4.58	30000	137.3		40000	183.1	
Zeugen & biggen	88.6	6.2	14.29	30000	428.7	70/360	40000	571.6	100/480
Vleeskuikens	0.0	1.4	0.00	4500	0.0				

Bij de berekende vrachten kan onderscheid worden gemaakt tussen de voorjaarsvracht en de totale jaarvracht. De eerste wordt hier verder als het realistische scenario beschouwd omdat toediening van gier uit mestkelders meestal in het voorjaar plaatsvindt, de tweede als 'worst case' indien alle gier van een heel jaar in een keer wordt toegediend.

De berekeningen in dit rapport zijn ook worst case doordat is gerekend met de hoogste oppervlaktedoses van de vier sectoren: vleesvarkens voor oxytetracycline, sulfamethoxazol en trimethoprim, en zeugen/biggen voor sulfadiazine (Tabel 1). Trimethoprim wordt gebruikt in combinatie met gesulfoneerde antibiotica. Voor trimethoprim is in het rapport verder gerekend met de vrachten die berekend zijn op basis van de 1:5 combinatie met sulfamethoxazol. Deze waren het grootst.

2.3 Stofeigenschappen

De stofeigenschappen die nodig zijn voor berekeningen met GeoPEARL zijn:

- De molecuulmassa (g)
- De dampdruk, p (Pa) bij een referentie temperatuur
- De oplosbaarheid in water, S (mg/L), bij een referentie temperatuur
- De coëfficiënt voor sorptie aan organische stof in de bodem, K_{om} (L/d)
- De halfwaardetijd van de (bio)degradatie in de bodem, DT_{50} (d)

De K_{om} -waarde werd voorafgaand aan de modelberekeningen omgerekend uit de K_{oc} , de coëfficiënt voor sorptie aan organisch koolstof in de bodem, door de K_{oc} te vermenigvuldigen met 0.57 (Smit et al., 1997).

In Bijlage 1 staan alle stofeigenschappen die op internet en in de literatuur gevonden zijn. Het was moeilijk de betrouwbaarheid van alle gegevens te verifiëren. In veel gevallen werd slechts één enkele waarde voor een bepaalde eigenschap achterhaald. Sommige gegevens waren sterk afwijkend van andere gegevens voor dezelfde parameters en dus mogelijk onbetrouwbaar. Dit soort data is niet meegenomen bij de modelberekeningen.

In Bijlage 1 is door middel van een grijze arcering aangegeven welke gegevens uiteindelijk zijn gebruikt. Wanneer meerdere acceptabele waarden voor dezelfde parameters werden gevonden, is het geometrisch gemiddelde bepaald (het gemiddelde van de logaritmes van de waarden weer terug gerekend naar een gewoon getal). Indien gegevens in meerdere bronnen werden gevonden waren de waarden soms identiek, waardoor er een vermoeden was dat dezelfde initiële bron is gebruikt. In deze gevallen is de waarde slechts een maal meegeteld in de berekening van het gemiddelde.

2.4 GeoPEARL berekeningen

In Tabel 2 zijn de geselecteerde gegevens opgesomd die zijn gebruikt om in GeoPEARL een aantal verschillende scenario's door te rekenen. Er is onderscheid gemaakt tussen een realistische toediening op basis van de voorjaarsgift die in de praktijk ook eenmalig is. Daarnaast is gerekend aan een 'worst case'. Hiervoor is aangenomen dat de berekende totale jaarvrachten uit Tamis et al. (2008) in één enkele keer worden toegediend. Daarnaast is voor deze worst case ook gerekend met een langere halfwaardetijd voor de omzetting in grond. Voor oxytetracycline, sulfadiazine en trimethoprim zijn hiervoor de hoogste in de literatuur gevonden waarden gebruikt. Voor sulfamethoxazol werd maar één DT_{50} gevonden en is voor de worst case gerekend met tien maal de gevonden waarde.

Tabel 2. Geselecteerde stoffeigenschappen en vrachten naar de bodem voor vier veel in Nederland gebruikte veterinaire antibiotica die zijn ingevoerd in GeoPEARL 3.3.3 (zie Bijlage 1 voor een overzicht van alle gevonden gegevens en de geraadpleegde bronnen).

Antibioticum	Molecuulgewicht	Dampdruk (mPa)	Water oplosbaarheid (g/L)	Sorptie-coëfficiënt Koc (L/kg)	Realistisch		Worst case	
					DT_{50} bodem (d)	Voorjaarsgift (g a.i./ha)	DT_{50} bodem (d)	Jaarvracht (g a.i./ha)
Oxytetracycline	460.44	1.29× E-19	0.55	47932	28.2	600	180	800
Sulfamethoxazol	253.28	2.49× E-04	0.42	181	2	620	20	830
Sulfadiazine	250.28	3.13× E-04	0.077	80.7	1.6	360	28	480
Trimethoprim*	290.32	1.32× E-03	0.4	123	51	120	100	170

*vrachten als bij toediening in mengsel met sulfamethoxazol

In GeoPEARL kan men een groot aantal variabelen instellen en keuzes maken met betrekking van het soort gewas, het tijdstip van toediening enzovoort. Er is voor deze oriënterende studie gekozen voor een aantal scenario's met toediening in het voorjaar op maïsakkers. De meeste maïsakkers zijn gelegen op zandgronden (Figuur 1). Deze scenario's komen overeen met toediening van varkensdrijfmest in Oost Nederland, waar ook het veldonderzoek van het SKB project 'Antibiotica in de Bodem zich op richtte'.

De volgende instellingen zijn gebruikt:


- Aantal plots = 250 (default waarde in GeoPEARL)
- Gewas = maïs
- Toedieningsfrequentie = 1× per jaar
- Toedieningsdatum = 15 april
- Toplaag van de bodem = 5 cm (de bodemlaag waarover de concentraties worden berekend)

Met GeoPEARL zijn voor de vier antibiotica vier verschillende GeoPEARL scenario's doorgerekend (zie ook Tabel 2 voor de doseringen en DT_{50} -waarden voor de realistische en worst case scenario's):

- Realistisch, inwerken over 5 cm van de bodem
- Worst case, inwerken over 5 cm van de bodem
- Realistisch, inwerken over 15 cm van de bodem
- Realistisch, injectie op 15 cm diepte in de bodem

Met inwerken wordt bedoeld dat het middel, of in dit geval de mest met het antibioticum, wordt verdeeld over een bodemlaag met een bepaalde dikte. Inwerken over 5 cm komt overeen met oppervlakkig inploegen of frezen, over 15 cm met wat dieper inploegen (NB – de bodemconcentraties worden bij inwerken over 15 cm nog steeds berekend over de genoemde toplaag van 5 cm). Bij injectie wordt het middel op een bepaalde diepte in de bodem ingebracht. In de praktijk wordt drijfmest vaak geïnjecteerd en de bodem enkele dagen later geploegd. Ploegen na inwerken is met GeoPEARL niet te simuleren.

De standaard uitvoer van GeoPEARL bestaat uit het 90-percentiel in de ruimte van de mediane uitspoelconcentratiewaarden in de tijd op 1 m diepte, d.w.z. in 90 van de 100 gevallen is de uitspoelconcentratie beneden deze waarde. De mediaan wordt berekend over 20 jaar.



Figuur 1. Maïsperven (links) en zandgronden (rechts) in Nederland (kaarten uit GeoPEARL 3.3.3).

3 Resultaten

De originele uitdraaien met de GeoPEARL invoer en berekeningen worden gegeven in Bijlage 2. In de paragrafen hierna worden de resultaten voor uitspoeling en persistentie in de bodem samengevat en kort besproken.

3.1 Uitspoeling naar grondwater

In Tabel 3 zijn de resultaten te zien van de uitspoelingsberekeningen met GeoPEARL. In de tabel is duidelijk te zien dat geen van de scenario's leidt tot uitspoeling van oxytetracycline en sulfamethoxazol. In het geval van sulfadiazine wordt voor het worst case scenario een uitspoelconcentratie van 0,032 µg/L berekend. Dit is een lage waarde en de concentratie komt voornamelijk tot stand omdat in het worst case scenario een halfwaardetijd van 28 dagen werd gebruikt in plaats van de 1,6 d uit het realistische scenario.

Voor trimethoprim leiden de realistische scenario's tot een uitspoelconcentratie van 0,016-0,019 µg/L. Dit wordt veroorzaakt doordat deze stof volgens de verzamelde gegevens aanzienlijk persistenter is in de bodem dan de andere drie antibiotica, de DT_{50} is met 51 dagen het langst. Ook Oxytetracycline heeft een wat langere halfwaardetijd (28 d), maar deze stof hecht weer veel sterker aan bodemdeeltjes dan de overige drie antibiotica (zie de K_{oc} -waarde in Tabel 2). Het worst case scenario voor trimethoprim leidt tot een hoge uitspoelconcentratie van circa 0.64 µg/L. Dit is gebaseerd op een maximale DT_{50} van 100 dagen. Bij de realistische scenario's voor trimethoprim geven inwerken over 15 cm en injectie op 15 cm diepte een iets hogere uitspoelconcentratie dan inwerken over 5 cm.

Tabel 3. Met GeoPEARL 3.3.3 berekende uitspoelconcentraties van antibiotica op 1m diepte na toediening via mest aan de bodem. Concentraties in µg/L als 90-percentiel in de ruimte van de mediane waarden over 20 jaar.

Scenario	Realistisch	Worst case	Realistisch	Realistisch
	Inwerken 5cm	Inwerken 5cm	Inwerken 15 cm	Injectie 15 cm
Oxytetracycline	0.000	0.000	0.000	0.000
Sulfamethoxazol	0.000	0.000	0.000	0.000
Sulfadiazine	0.000	0.032	0.000	0.000
Trimethoprim	0.016	0.636	0.019	0.019

3.2 Persistentie in bodem & poriewater

De standaard uitvoer van GeoPEARL 3.3.3 voor de berekening van de persistentie in de bodem en het poriewater bestaat uit de concentraties in de bodem op basis van het 'Community Recovery Principle' (CRP) en het 'Ecological Threshold Principle' (ETP). Deze parameters betreffen de concentraties respectievelijk 2 jaar na de laatste

toediening en 7 jaar na de laatste toediening. De uitvoer van GeoPEARL bestaat verder uit het verloop van de CRP en ETP concentraties gedurende 365 dagen volgend op het moment van 2 respectievelijk 7 jaar na de laatste toediening.

In Tabel 4 worden voor de vier antibiotica de concentraties in de bodem 2 jaar en 7 jaar na toediening gegeven, in Tabel 5 de bijbehorende poriewaterconcentraties.

Tabel 4. Met GeoPEARL 3.3.3 berekende totale concentraties van antibiotica in de toplaag van de bodem (bovenste 5 cm) na toediening van mest aan maïsakkers. Concentratie in $\mu\text{g}/\text{kg}$ 2 jaar na laatste toediening en 7 jaar na laatste toediening.

Scenario	Realistisch Inwerken 5cm		Worst case Inwerken 5cm		Realistisch Inwerken 15 cm		Realistisch Injectie 15 cm	
	2 jr.	7 jr.	2 jr.	7 jr.	2 jr.	7 jr.	2 jr.	7 jr.
	Oxytetracycline	0.249	0.000	279.3	15.52	0.231	0.000	0.231
Sulfamethoxazol	0.000	0.000	0.012	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sulfadiazine	0.000	0.000	0.072	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trimethoprim	0.670	0.000	8.091	0.020	0.654	0.000	0.613	0.000

Tabel 5. Met GeoPEARL 3.3.3 berekende totale concentratie van antibiotica in het poriewater van de toplaag van de bodem (bovenste 5 cm) na toediening van mest aan maïsakkers. Concentratie in $\mu\text{g}/\text{L}$ 2 jaar na laatste toediening en 7 jaar na laatste toediening.

Scenario	Realistisch Inwerken 5cm		Worst case Inwerken 5cm		Realistisch Inwerken 15 cm		Realistisch Injectie 15 cm	
	2 jr.	7 jr.	2 jr.	7 jr.	2 jr.	7 jr.	2 jr.	7 jr.
	Oxytetracycline	0.000	0.000	0.075	0.003	0.000	0.000	0.000
Sulfamethoxazol	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sulfadiazine	0.000	0.000	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trimethoprim	0.065	0.000	0.866	0.002	0.065	0.000	0.020	0.000

Uit de tabellen blijkt dat de sulfaverbindingen sulfamethoxazol en sulfadiazine volgens de realistische scenario's niet persistent zijn in de bodem en het poriewater. Zij zijn al na 2 jaar verdwenen. Onder het worst case scenario zouden zij na 2 jaar nog in lage concentraties (nanogram range) kunnen voorkomen maar na 7 jaar alsnog verdwenen zijn.

Oxytetracycline is persistenter, met name in de bodem (Tabel 4), waarschijnlijk omdat het middel in vergelijking met de andere antibiotica sterk aan het organisch stof in de bodem hecht en dus minder uitspoelt. Het zou in het poriewater alleen onder worst case omstandigheden worden aangetroffen (Tabel 5). In het worst case scenario is de persistentie in de bodem ook veel groter (Tabel 4).

Trimethoprim is eveneens persistenter dan de sulfaverbindingen. Onder het realistische scenario zou het na 2 jaar nog in zowel de bodem als het poriewater kunnen worden aangetroffen in lage concentraties ($<1 \mu\text{g}/\text{kg}$ bodem, $<1 \mu\text{g}/\text{L}$ poriewater). De verklaring is de relatief lange halfwaardetijd (51 d). Ook hier leidt het worst case scenario tot een veel grotere persistentie.

4 Discussie & conclusies

De met GeoPEARL 3.3.3 berekende uitspoelconcentraties (90-percentielen van de mediane waarden over 20 jaar) na toediening aan maïsakkers half april waren allen laag voor de realistische scenario's (voorjaarsvrucht en gemiddelde DT_{50} uit de literatuur). Oxytetracycline, sulfamethoxazol en sulfadiazine zouden volgens de berekeningen niet uitspoelen, trimethoprim in een lage concentratie. Trimethoprim spoelt aanzienlijk meer uit onder 'worst case' omstandigheden (lange halfwaardetijd, hoge vrucht). De uitspoelconcentraties lagen bij het realistische scenario echter onder de Europese drempelconcentratie van $0.1 \mu\text{g/L}$ voor grondwater waarboven een nadere risicoanalyse van grondwater zou moeten worden uitgevoerd (EMEA, 2006). Onder het worst case scenario kwam de concentratie voor trimethoprim als enige van de vier antibiotica wel boven de $0.1 \mu\text{g/L}$ uit.

Om de persistentie te bepalen zijn met GeoPEARL de bodem- en poriewater concentraties 2 jaar en 7 jaar na stoppen van een jaarlijkse toediening gedurende 20 jaar geschat. Sulfamethoxazol en sulfadiazine komen na 2 jaar niet meer voor in de bodem en het poriewater. Omdat deze stoffen ook al niet uitspoelen en een lage dampdruk hebben, kan worden geconcludeerd dat deze stoffen voornamelijk verdwijnen via afbraak in de bodem. Dit wordt gestaafd door een halfwaardetijd in de bodem van respectievelijk 2 dagen en 1,6 dagen. Oxytetracycline is persistenter en zou volgens de modelberekeningen na 2 jaar nog in de bodem aanwezig zijn maar niet in het poriewater. Dit valt te verklaren doordat oxytetracycline een langere halfwaardetijd heeft dan de twee gesulfoneerde antibiotica en zich van de vier stoffen het sterkst hecht aan het bodemmateriaal. Trimethoprim ten slotte is van de stoffen het meest persistent (DT_{50} 51 d). In de realistische scenario's is deze stof 7 jaar na stoppen van de jaarlijkse toedieningen echter ook verdwenen uit de toplaag.

Uit de berekeningen kwam trimethoprim, zoals gezegd, naar voren als de enige van de vier stoffen die uitspoelt en als meest persistent. Dit antibioticum behoeft daarom meer aandacht in risicoanalyses en bij monitoring, ook omdat het in combinatie met verschillende andere antibiotica wordt gebruikt. De totale emissie in het milieu kan dus groter zijn dan op basis van één soort medicijn te verwachten is.

Voor alle berekende parameters geldt dat er geen grote verschillen waren tussen de drie doorgerekende realistische toedieningsscenario's: inwerken over 5 cm, inwerken over 15 cm en injecteren op 15 cm.

De uitkomst van de GeoPEARL berekeningen staat of valt met de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens om in het model in te voeren. Voor de vier antibiotica in deze studie werd slechts een beperkte hoeveelheid gegevens gevonden in openbare bronnen, ondanks het feit dat het hier veel gebruikte middelen betreft. DT_{50} waarden waren het moeilijkst te achterhalen en als er meerdere waarden beschikbaar waren, liepen deze soms sterk uiteen (zie de gegevens voor oxytetracycline en sulfadiazine in Bijlage 1). Ook K_{oc} waarden voor hetzelfde antibioticum verschilden soms aanzienlijk

(sulfadiazine) en er is geen rekening gehouden met het feit dat de sorptie van sommige antibiotica pH-afhankelijk kan zijn. Gezien het sterke effect op de modelberekeningen, lijkt het vooral van belang dat de voor GeoPEARL gebruikte halfwaardetijden beter onderbouwd worden. Dit is op dit moment misschien wel de grootste bottleneck.

Naast betrouwbare stofgegevens zijn ook de vrachten naar de bodem van groot belang. Voor deze studie zijn deze berekend op basis van de (gemiddeld) gebruikte doses per doeldier, de gemiddelde hoeveelheid mest die door deze dieren wordt geproduceerd en de gemiddelde vrachten mest die op de bodem worden gebracht. Met afbraak in de mestkelder gedurende het winterseizoen is bij gebrek aan gegevens geen rekening gehouden. Daarnaast is aangenomen dat alle maïsakkers in Nederland een mestgift met antibiotica uit een bepaalde veehouderijsector ontvangen. Dit zal in de praktijk niet het geval zijn. De resultaten van het ‘realistische’ scenario zijn om deze redenen al enigszins worst case en de uitkomsten voor het ‘worst case’ scenario moeten in dit licht misschien als een onrealistische ‘worst case’ worden beschouwd. Op basis van deze eerste berekeningen is echter wel aan te geven hoe de vier stoffen uit de studie onderling verschillen qua uitspoelgedrag en persistentie.

Al met al zijn er genoeg redenen om de uitkomsten van deze oriënterende studie met voorzichtigheid te interpreteren. Dit ligt vooral aan de kwaliteit van de invoergegevens en minder aan het model zelf. De publiekelijk beschikbare gegevens ten aanzien van de stoffeïenschappen waren niet goed te valideren en mogelijk van een wisselende kwaliteit.

GeoPEARL 3.3.3 is een ‘state-of-the-art’, landsdekkend model dat gericht is op de berekening van doelgrootheden voor de registratie van gewasbeschermingsmiddelen. Het is echter minder geschikt voor het afleiden van locatiespecifieke lotgevallen. Dit soort berekeningen kan worden uitgevoerd met het gewone PEARL model waarmee gedetailleerd de lotgevallen op een specifieke locatie kunnen worden doorgerkend. . In dat geval is een profielbeschrijving nodig van de bodemhorizonten ter plekke: per bodemlaag organische stof, minerale samenstelling, vochtcharacteristieken, enz. Verder is per locatie informatie vereist over het sorptiegedrag en de omzettingssnelheid van een stof. Een alternatief is om een FOCUS grondwater scenario te kiezen (FOCUS, 2000) en dan met FOCUS-PEARL berekeningen uit te voeren voor diergeneesmiddelen. FOCUS scenario’s zijn ontwikkeld om op Europees niveau de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar grondwater te berekenen. Hiervoor is een speciale versie van PEARL ontwikkeld. Van de 10 FOCUS scenario’s ligt het Hamburg scenario het dichtst bij Nederland, maar in de richtlijn van de EMEA (2006) voor risicoanalyse van diergeneesmiddelen wordt bijvoorbeeld het Okehampton scenario in Groot-Brittannië gesuggereerd. Voor de eerste tier beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen wordt het Kremsmünster scenario gehanteerd.

Op basis van deze studie kan geconcludeerd worden dat indien er goede informatie met betrekking tot de stoffeïenschappen beschikbaar is, bijvoorbeeld de informatie van de fabrikanten zelf, GeoPEARL in de toekomst in principe gebruikt kan worden

voor het modelleren van de lotgevallen van diergeneesmiddelen ten behoeve van de risicobeoordeling voor registratiedoelinden. Er kunnen namelijk verschillende relevante scenario's voor diergeneesmiddelen mee worden doorgerekend. Verder kan het model worden ingezet bij het bepalen van gebieden met de hoogste risico's ('hot spots') en bij het ontwerpen van monitoringsprogramma's. Hiertoe is het eerst nog wel nodig om de invoer en de uitvoer van het model aan te passen op een aantal wezenlijke punten:

- *Invoer van het model*
 - Er moet vóór het invoeren van gegevens in GeoPEARL met de lotgevallen van de diergeneesmiddelen in mestkelders rekening worden gehouden.
 - In principe zouden alleen berekeningen uitgevoerd moeten worden voor plots waar de middelen ook echt terecht komen. Hiertoe moet voor mest de koppeling met het gewas gedeeltelijk worden losgelaten en een extra kaart worden geconstrueerd met gebieden waar mest uit een bepaalde veehouderijsector uitgereden wordt.
- *Modelaanpassingen.*
 - In het kader van realistische scenario's voor mest zouden mestinjectie en ploegen in combinatie doorgerekend moeten kunnen worden.
- *Uitvoer van het model.*
 - Uitvoer van de initiële concentraties ('PEC_{initial}') in de toplaag van de bodem en het poriewater direct na toediening van mest.
 - Uitvoer van de ophoping in de toplaag van de bodem gedurende de toedieningsperiode van diergeneesmiddelen.

Daarnaast is het belangrijk om de uitkomsten van het onderliggende PEARL model te toetsen middels onderzoek in het veld.

Naast het gebruik voor registratiedoelinden kunnen GeoPEARL en aanverwante modellen ook gebruikt worden voor het doorrekenen van verschillende scenario's voor de boerenpraktijk en de dierenartsenpraktijk, bijvoorbeeld ten aanzien van de methoden van in de bodem brengen (zoals in dit rapport onderwerpen versus injecteren), het tijdstip van toediening van mest aan de bodem en de keuze van minder milieuschadelijke diergeneesmiddelen indien er voor een aandoening meerdere middelen beschikbaar zijn. Met hulp van GeoPEARL kunnen dus vuistregels worden afgeleid om de ecologische risico's van het gebruik van diergeneesmiddelen in de praktijk te reduceren.

Literatuur

Berg, F. van den, A. Tiktak, J.G. Groenwold, D.W.G. van Kraalingen, A.M.A. van der Linden & J.J.T.I. Boesten. 2008. Documentation update for GeoPEARL_3.3.3. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Werkdocument nr. 103, Alterra, Wageningen UR/Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen/Bilthoven.

Drillia, P., K. Stamatelatos & G. Lyberatos. 2005. Fate and mobility of pharmaceuticals in solid matrices. *Chemosphere* 60: 1034-1044.

EMA. 2006. Guideline on environmental impact assessment for veterinary medicinal products in support of the VICH Guidelines GL6 and GL38. European Medicines Agency, Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP), London.

FOCUS. 2000. FOCUS groundwater scenarios in the EU review of active substances. Report of the FOCUS Groundwater Scenarios Workgroup, EC Document Reference SANCO/321/2000 rev. 2, Europese Unie, Brussel, 202 pp.

Kay, P., P.A. Blackwell & A.B.A. Boxall. 2004. Fate of veterinary antibiotics in a macroporous tile drained clay soil. *Environmental Toxicology and Chemistry* 23: 1136-1144.

Kotzerke, A., S. Sharma, K. Schauss, H. Heuer, S. Thiele-Bruhn, K. Smalla, B.-M. Wilke & M. Schloter. 2008. Alterations in soil microbial activity and N-transformation processes due to sulfadiazine loads in pig-manure. *Environmental Pollution* 153: 315-322.

Lissemore, L., C. Hao, P. Yang, P.K. Sibley, S. Mabury & K.R. Solomon. An exposure assessment for selected pharmaceuticals within a watershed in Southern Ontario. *Chemosphere* 64: 717-729.

Rabølle, M. & N.H. Spliid. 2000. Sorption and mobility of metronidazole, olaquinox, oxytetracycline and tylosin in soil. *Chemosphere* 40: 715-722.

Smit, A.A.M.F.R., F. van den Berg & M. Leistra. 1997. Estimation method for the volatilisation of pesticides from fallow soils. Environmental Planning Bureau series 2, DLO Winand Staring Centre, Wageningen.

Sukul, P. & M. Spitteler. 2006. Sulfonamides in the environment as veterinary drugs. *Reviews in Environmental Contamination and Toxicology* 187: 67-101.

Tamis, W.L.M., P.G.L. Klinkhamer, E. van der Meijden & J.A. van Veen. 2008. Potentiële effecten van diergeneesmiddelen op het terrestrische milieu in Nederland.

Thiele-Bruhn, S. 2003. Pharmaceutical antibiotic compounds in soils – a review. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science* 166: 145-167.

Thiele-Bruhn, S. & M.-O. Aust. 2004. effects of pig slurry on the sorption of sulfonamide antibiotics in soil. *Archives of Environmental Contamination and Toxicology* 47: 31-39.

Tiktak, A., A.M.A. van der Linden & J.J.T.I. Boesten. 2003. The GeoPEARL model. Model description, applications and manual. RIVM rapport nr. 716601007/2003, RIVM/Alterra, Bilthoven/Wageningen.

Tiktak, A., A.M.A. van der Linden, J.J.T.I. Boesten, R. Kruijne, D. van Kraalingen & F. van den Berg. 2006. The GeoPEARL model version 2.2.2. Part II. User guide and model description update. RIVM rapport nr. 716601008/2004-2006, Milieu en Natuur Planbureau/RIVM/Alterra, Bilthoven/Bilthoven/Wageningen.

Tolls, J. 2001. Sorption of veterinary pharmaceuticals in soils: a review. *Environmental Science and Technology* 35: 3397-3406.

Topp, E, S.C. Monteiro, A. Beck, B.B. Coelho, A.B.A. Boxall, P.W. Duenk, S. Kleywegt, D.R. Lapen, M. Payne, L. Sabourin, H. Li & C.D. Metcalfe. 2008. Runoff of pharmaceuticals and personal care products following application of biosolids to an agricultural field. *Science of the Total Environment* 396: 52-59.

VICH (2000) Environmental impact assessment (EIAs) for veterinary medicinal products (VMPs) – Phase I. Rapport VICH GL6 (Ecotoxicity Phase I), June 2000, for implementation at Step 7, International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for registration of Veterinary Medicinal Products (VICH), Brussel.

VICH (2004) Environmental impact assessment (EIAs) for veterinary medicinal products (VMPs) – Phase II. Rapport VICH GL38 (Ecotoxicity Phase II), October 2004, for implementation at Step 7, International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products (VICH), Brussel.

Wehrhan, A., R. Kasteel, J. Simunek, J. Groeneweg & H. Vereecken. 2007. Transport of sulfadiazine in soil columns – experiments and modelling approaches. *Journal of Contaminant Hydrology* 89: 107-135.

Wightwick, A. & G. Allinson. 2008. Compilation of agrochemicals registered for use in Victoria and their physical-chemical properties. Report. The State of Victoria, Department of Primary Industries, Queenscliff, Victoria, Australië, 29 p.

Bijlage 1 Stofeigenschappen van geselecteerde antibiotica

Stofeigenschappen van geselecteerde antibiotica. De grijs gearceerde gegevens zijn gebruikt voor de GeoPEARL berekeningen.

Pharmaceutical	CAS #	MW Source	Vp T (°C)	Source	Solubility (g/L)	T (°C)	Source
Oxytetracycline	79-57-2	460.44 Tolls 2001	1.29E-19mPa	Wightwick & Allinson 2008	0.3 1		Kay et al 2004 Tolls 2001
Sulfamethoxazole	723-46-6	253.28 Sukul & Spitteler 2006	1.87E-9 Torr	25 Sukul & Spitteler 2006	0.61 0.29	20	drugbank.ca wildlifeinformation.org
Sulfadiazine	68-35-9	250.28 Sukul & Spitteler 2006	1.28E-10Torr 5.745E-6Pa NR	25 Sukul & Spitteler 2006 Wehrhan et al 2007 Wightwick & Allinson 2008	0.077 0.013-0.077 0.077		Sukul & Spitteler 2006 Wehrhan et al 2007 Wightwick & Allinson 2008
Trimethoprim	738-70-5	290.32 Wightwick & Allinson 2008	9.88E-9 mmHg 1.32E-3 mPa	25 Lissemore et al 2006 Wightwick & Allinson 2008	0.4 0.4		Lissemore et al 2006 Wightwick & Allinson 2008

Pharmaceutical	CAS #	Koc (L/kg)	Source	DT50 soil (d)	Source	
Oxytetracycline	79-57-2	42506	sandy loam soil	Rabølle & Spliid 2000	18.2	Kay et al 2004
		47881	sandy soil	Rabølle & Spliid 2000	>180 soil + manure	Thiele-Bruhn 2003
		93317	sandy loam soil	Rabølle & Spliid 2000	43.8 aer sediment slurry	Thiele-Bruhn 2003
		27792	loamy sand soil	Rabølle & Spliid 2000		
Sulfamethoxazole	723-46-6	4.44	at pH 7	Sukul & Spitteler 2006	2	Topp et al 2008
		530	high OM	Drillia et al 2005		
		62	low OM	Drillia et al 2005		
Sulfadiazine	68-35-9	124	silt loam	Thiele-Bruhn 2003	>28 manure/sludge	Thiele-Bruhn 2003
		81	clay loam	Thiele-Bruhn 2003	1.6 man/sludge respiked	Thiele-Bruhn 2003
		124	unfert. Soil	Thiele-Bruhn & Aust 2004	4<<32 sandy/silty	Kotzerke et al 2008
		73.2	soil-slurry	Thiele-Bruhn & Aust 2004		
		37-126		Wightwick & Allinson 2008		
4.95	at pH 7	Sukul & Spitteler 2006				
Trimethoprim	738-70-5	205	sewage sludge	Thiele-Bruhn 2003	22-41 sewage sludge	Thiele-Bruhn 2003
		74	soil	Wightwick & Allinson 2008	75-100 soil	Wightwick & Allinson 2008

Bijlage 2 Beschrijving van de uitgevoerde GeoPEARL 3.3.3 berekeningen

Assessment nr.	Stof	Scenario	Toediening aan bodem
5	Oxytetracycline	Realistisch	Inwerken in bovenste 5 cm
6	Sulfamethoxazol	Realistisch	Inwerken in bovenste 5 cm
7	Sulfadiazine	Realistisch	Inwerken in bovenste 5 cm
8	Trimethoprim	Realistisch	Inwerken in bovenste 5 cm
10	Oxytetracycline	Worst case	Inwerken in bovenste 5 cm
11	Sulfamethoxazol	Worst case	Inwerken in bovenste 5 cm
12	Sulfadiazine	Worst case	Inwerken in bovenste 5 cm
13d	Trimethoprim	Worst case	Inwerken in bovenste 5 cm
15	Oxytetracycline	Realistisch	Inwerken in bovenste 15 cm
16	Sulfamethoxazol	Realistisch	Inwerken in bovenste 15 cm
17	Sulfadiazine	Realistisch	Inwerken in bovenste 15 cm
18	Trimethoprim	Realistisch	Inwerken in bovenste 15 cm
19	Oxytetracycline	Realistisch	Injecteren op 15 cm diepte
20	Sulfamethoxazol	Realistisch	Injecteren op 15 cm diepte
21	Sulfadiazine	Realistisch	Injecteren op 15 cm diepte
22	Trimethoprim	Realistisch	Injecteren op 15 cm diepte

GeoPEARL 3.3.3 REPORT: "Assessment5"

Date: 03/04/2009

General information

Number of plots: 250
 No plot selection was applied

Crop : Maize
 Plot count : 250
 Total area : 2688112.50
 Crop area : 228247.85

Combinations of crops and applications considered in 90th percentile calculation:

Crop : Maize
 Application Interval (a) : 1

Absolute Applications

Application (Incorporation) at 15-Apr;
 Dosage : 0.6 kg.ha-1

GeoPEARL summary for compound "Oxy"

Molar mass (g.mol-1) : 460.44
 Saturated vapour pressure (Pa) : 1.29E-22; measured at (C) 20
 Solubility in water (mg.L-1) : 550; measured at (C) 20
 Reference half-life (d) : 28.2; measured at (C) 20
 Option for Half-life : Input
 Freundlich exponent (-) : 0.9
 Molar enthalpy of sorption (kJ mol-1) : 0
 Freundlich Sorption Option : Kom, pH-independent
 Kom (coef. for sorption on org. matter (L kg-1)) : 27321; measured at (C) 20

Summary for leaching

From each run the 20 averaged concentrations from the 20 calculation periods were selected.
 From these 20 values the median value was taken.
 Using this median value the 90th percentile in space was calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

The resulting 90th percentile concentration (ug/L) was: 0.000000

The 90th percentile concentrations of the different crops in the areas of use were:

Crop	Conc. (ug/L)	Area
Maize	0.000000	228971.39

Summary for persistence

For the assessment of persistence in the Dutch pesticide registration procedure the following quantities were calculated:

- total content of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence
- pore water concentration of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence.

The report below describes these two quantities for different time windows for averaging as indicated and for two moments in time that are linked to two protection goals as follows:

- the quantity as calculated 2 years after the last application of the pesticide, linked to the Community Recovery Principle (called 'CRP')
- the quantity as calculated 7 years after the last application of the pesticide, linked to the Ecological Threshold Principle (called 'ETP')

Using these quantities, the 90th percentiles in space were calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

Persistence output was based on a thickness layer of 0.05 meter

Overall persistence results:

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0002487	0.0000000
7 days	0.0002387	0.0000000
14 days	0.0002290	0.0000000
21 days	0.0002202	0.0000000
28 days	0.0002115	0.0000000
56 days	0.0001803	0.0000000
180 days	0.0000938	0.0000000
365 days	0.0000519	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Crop = Maize

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0002487	0.0000000
7 days	0.0002387	0.0000000
14 days	0.0002290	0.0000000
21 days	0.0002202	0.0000000
28 days	0.0002115	0.0000000
56 days	0.0001803	0.0000000
180 days	0.0000938	0.0000000
365 days	0.0000519	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

GeoPEARL 3.3.3 REPORT: "Assessment6"

Date: 04/04/2009

General information

Number of plots: 250
 No plot selection was applied

Crop : Maize
 Plot count : 250
 Total area : 2688112.50
 Crop area : 228247.85

Combinations of crops and applications considered in 90th percentile calculation:

Crop : Maize
 Application Interval (a) : 1

Absolute Applications

Application (Incorporation) at 15-Apr;
 Dosage : 0.62 kg.ha-1

GeoPEARL summary for compound "Sulf"

Molar mass (g.mol-1) : 253.28
 Saturated vapour pressure (Pa) : 2.49E-7; measured at (C) 20
 Solubility in water (mg.L-1) : 420; measured at (C) 20
 Reference half-life (d) : 2; measured at (C) 20
 Option for Half-life : Input
 Freundlich exponent (-) : 0.9
 Molar enthalpy of sorption (kJ mol-1) : 0
 Freundlich Sorption Option : Kom, pH-independent
 Kom (coef. for sorption on org. matter (L kg-1)) : 103.17; measured at (C) 20

Summary for leaching

From each run the 20 averaged concentrations from the 20 calculation periods were selected.
 From these 20 values the median value was taken.
 Using this median value the 90th percentile in space was calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

The resulting 90th percentile concentration (ug/L) was: 0.000000

The 90th percentile concentrations of the different crops in the areas of use were:

Crop	Conc. (ug/L)	Area
Maize	0.000000	228971.39

Summary for persistence

For the assessment of persistence in the Dutch pesticide registration procedure the following quantities were calculated:
 - total content of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence
 - pore water concentration of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence.
 The report below describes these two quantities for different time windows for averaging as indicated and for two moments in time that are linked to two protection goals as follows:

- the quantity as calculated 2 years after the last application of the pesticide, linked to the Community Recovery Principle (called 'CRP')
- the quantity as calculated 7 years after the last application of the pesticide, linked to the Ecological Threshold Principle (called 'ETP')

Using these quantities, the 90th percentiles in space were calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

Persistence output was based on a thickness layer of 0.05 meter

Overall persistence results:

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Crop = Maize

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

GeoPEARL 3.3.3 REPORT: "Assessment7"

Date: 04/04/2009

General information

Number of plots: 250
 No plot selection was applied

Crop : Maize
 Plot count : 250
 Total area : 2688112.50
 Crop area : 228247.85

Combinations of crops and applications considered in 90th percentile calculation:

Crop : Maize
 Application Interval (a) : 1

Absolute Applications

Application (Incorporation) at 15-Apr;
 Dosage : 0.36 kg.ha-1

GeoPEARL summary for compound "Sdz"

Molar mass (g.mol-1) : 250.28
 Saturated vapour pressure (Pa) : 3.13E-7; measured at (C) 20
 Solubility in water (mg.L-1) : 77; measured at (C) 20
 Reference half-life (d) : 1.6; measured at (C) 20
 Option for Half-life : Input
 Freundlich exponent (-) : 0.9
 Molar enthalpy of sorption (kJ mol-1) : 0
 Freundlich Sorption Option : Kom, pH-independent
 Kom (coef. for sorption on org. matter (L kg-1)) : 46; measured at (C) 20

Summary for leaching

From each run the 20 averaged concentrations from the 20 calculation periods were selected.
 From these 20 values the median value was taken.
 Using this median value the 90th percentile in space was calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

The resulting 90th percentile concentration (ug/L) was: 0.000000

The 90th percentile concentrations of the different crops in the areas of use were:

Crop	Conc. (ug/L)	Area
Maize	0.000000	228971.39

Summary for persistence

For the assessment of persistence in the Dutch pesticide registration procedure the following quantities were calculated:

- total content of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence
- pore water concentration of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence.

The report below describes these two quantities for different time windows for averaging as indicated and for two moments in time that are linked to two protection goals as follows:

- the quantity as calculated 2 years after the last application of the pesticide, linked to the Community Recovery Principle (called 'CRP')
- the quantity as calculated 7 years after the last application of the pesticide, linked to the Ecological Threshold Principle (called 'ETP')

Using these quantities, the 90th percentiles in space were calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

Persistence output was based on a thickness layer of 0.05 meter

Overall persistence results:

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Crop = Maize

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

GeoPEARL 3.3.3 REPORT: "Assessment8"

Date: 05/04/2009

General information

Number of plots: 250
 No plot selection was applied

Crop : Maize
 Plot count : 250
 Total area : 2688112.50
 Crop area : 228247.85

Combinations of crops and applications considered in 90th percentile calculation:

Crop : Maize
 Application Interval (a) : 1

Absolute Applications
 Application (Incorporation) at 15-Apr;
 Dosage : 0.12 kg.ha-1

GeoPEARL summary for compound "Tri"

Molar mass (g.mol-1) : 290.32
 Saturated vapour pressure (Pa) : 1.32E-6; measured at (C) 20
 Solubility in water (mg.L-1) : 400; measured at (C) 20
 Reference half-life (d) : 51; measured at (C) 20
 Option for Half-life : Input
 Freundlich exponent (-) : 0.9
 Molar enthalpy of sorption (kJ mol-1) : 0
 Freundlich Sorption Option : Kom, pH-independent
 Kom (coef. for sorption on org. matter (L kg-1)) : 70.11; measured at (C) 20

Summary for leaching

From each run the 20 averaged concentrations from the 20 calculation periods were selected.
 From these 20 values the median value was taken.
 Using this median value the 90th percentile in space was calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

The resulting 90th percentile concentration (ug/L) was: 0.016342

The 90th percentile concentrations of the different crops in the areas of use were:

Crop	Conc. (ug/L)	Area
Maize	0.016342	228971.39

Summary for persistence

For the assessment of persistence in the Dutch pesticide registration procedure the following quantities were calculated:
 - total content of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence
 - pore water concentration of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence.
 The report below describes these two quantities for different time windows for averaging as indicated and for two moments in time that are linked to two protection goals as follows:
 - the quantity as calculated 2 years after the last application of the pesticide, linked to the Community Recovery Principle (called 'CRP')
 - the quantity as calculated 7 years after the last application of the pesticide, linked to the Ecological Threshold Principle (called 'ETP')

Using these quantities, the 90th percentiles in space were calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

Persistence output was based on a thickness layer of 0.05 meter

Overall persistence results:

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0006704	0.0000000
7 days	0.0006545	0.0000000
14 days	0.0006363	0.0000000
21 days	0.0006185	0.0000000
28 days	0.0006027	0.0000000
56 days	0.0005439	0.0000000
180 days	0.0003454	0.0000000
365 days	0.0002289	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0652729	0.0000000
7 days	0.0642114	0.0000000
14 days	0.0622114	0.0000000
21 days	0.0602114	0.0000000
28 days	0.0576581	0.0000000
56 days	0.0522114	0.0000000
180 days	0.0319506	0.0000000
365 days	0.0203915	0.0000000

Crop = Maize

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0006704	0.0000000
7 days	0.0006545	0.0000000
14 days	0.0006363	0.0000000
21 days	0.0006185	0.0000000
28 days	0.0006027	0.0000000
56 days	0.0005439	0.0000000
180 days	0.0003454	0.0000000
365 days	0.0002289	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0652729	0.0000000
7 days	0.0642114	0.0000000
14 days	0.0622114	0.0000000
21 days	0.0602114	0.0000000
28 days	0.0576581	0.0000000
56 days	0.0522114	0.0000000
180 days	0.0319506	0.0000000
365 days	0.0203915	0.0000000

GeoPEARL 3.3.3 REPORT: "Assessment10"

Date: 08/04/2009

General information

Number of plots: 250
 No plot selection was applied

Crop : Maize
 Plot count : 250
 Total area : 2688112.50
 Crop area : 228247.85

Combinations of crops and applications considered in 90th percentile calculation:

Crop : Maize
 Application Interval (a) : 1

Absolute Applications

Application (Incorporation) at 15-Apr;
 Dosage : 0.8 kg.ha-1

GeoPEARL summary for compound "OxyWC"

Molar mass (g.mol-1) : 460.44
 Saturated vapour pressure (Pa) : 1.29E-22; measured at (C) 20
 Solubility in water (mg.L-1) : 550; measured at (C) 20
 Reference half-life (d) : 180; measured at (C) 20
 Option for Half-life : Input
 Freundlich exponent (-) : 0.9
 Molar enthalpy of sorption (kJ mol-1) : 0
 Freundlich Sorption Option : Kom, pH-independent
 Kom (coef. for sorption on org. matter (L kg-1)) : 27321; measured at (C) 20

Summary for leaching

From each run the 20 averaged concentrations from the 20 calculation periods were selected.
 From these 20 values the median value was taken.
 Using this median value the 90th percentile in space was calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

The resulting 90th percentile concentration (ug/L) was: 0.000000

The 90th percentile concentrations of the different crops in the areas of use were:

Crop	Conc. (ug/L)	Area
Maize	0.000000	228971.39

Summary for persistence

For the assessment of persistence in the Dutch pesticide registration procedure the following quantities were calculated:

- total content of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence
- pore water concentration of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence.

The report below describes these two quantities for different time windows for averaging as indicated and for two moments in time that are linked to two protection goals as follows:

- the quantity as calculated 2 years after the last application of the pesticide, linked to the Community Recovery Principle (called 'CRP')
- the quantity as calculated 7 years after the last application of the pesticide, linked to the Ecological Threshold Principle (called 'ETP')

Using these quantities, the 90th percentiles in space were calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

Persistence output was based on a thickness layer of 0.05 meter

Overall persistence results:

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.2792823	0.0155248
7 days	0.2776067	0.0154238
14 days	0.2757545	0.0153379
21 days	0.2739791	0.0152495
28 days	0.2722323	0.0151521
56 days	0.2649571	0.0147282
180 days	0.2310524	0.0127748
365 days	0.2005326	0.0109280

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0754079	0.0033232
7 days	0.0749937	0.0032961
14 days	0.0746158	0.0032732
21 days	0.0737744	0.0032415
28 days	0.0734079	0.0031979
56 days	0.0714517	0.0030864
180 days	0.0608988	0.0028396
365 days	0.0520764	0.0024756

Crop = Maize

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.2792823	0.0155248
7 days	0.2776067	0.0154238
14 days	0.2757545	0.0153379
21 days	0.2739791	0.0152495
28 days	0.2722323	0.0151521
56 days	0.2649571	0.0147282
180 days	0.2310524	0.0127748
365 days	0.2005326	0.0109280

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0754079	0.0033232
7 days	0.0749937	0.0032961
14 days	0.0746158	0.0032732
21 days	0.0737744	0.0032415
28 days	0.0734079	0.0031979
56 days	0.0714517	0.0030864
180 days	0.0608988	0.0028396
365 days	0.0520764	0.0024756

GeoPEARL 3.3.3 REPORT: "Assessment11"

Date: 08/04/2009

General information

Number of plots: 250
 No plot selection was applied

Crop : Maize
 Plot count : 250
 Total area : 2688112.50
 Crop area : 228247.85

Combinations of crops and applications considered in 90th percentile calculation:

Crop : Maize
 Application Interval (a) : 1

Absolute Applications

Application (Incorporation) at 15-Apr;
 Dosage : 0.83 kg.ha-1

GeoPEARL summary for compound "SulfWC"

Molar mass (g.mol-1) : 253.28
 Saturated vapour pressure (Pa) : 2.49E-7; measured at (C) 20
 Solubility in water (mg.L-1) : 420; measured at (C) 20
 Reference half-life (d) : 20; measured at (C) 20
 Option for Half-life : Input
 Freundlich exponent (-) : 0.9
 Molar enthalpy of sorption (kJ mol-1) : 0
 Freundlich Sorption Option : Kom, pH-independent
 Kom (coef. for sorption on org. matter (L kg-1)) : 103.17; measured at (C) 20

Summary for leaching

From each run the 20 averaged concentrations from the 20 calculation periods were selected.
 From these 20 values the median value was taken.
 Using this median value the 90th percentile in space was calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

The resulting 90th percentile concentration (ug/L) was: 0.000000

The 90th percentile concentrations of the different crops in the areas of use were:

Crop	Conc. (ug/L)	Area
Maize	0.000000	228971.39

Summary for persistence

For the assessment of persistence in the Dutch pesticide registration procedure the following quantities were calculated:

- total content of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence
- pore water concentration of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence.

The report below describes these two quantities for different time windows for averaging as indicated and for two moments in time that are linked to two protection goals as follows:

- the quantity as calculated 2 years after the last application of the pesticide, linked to the Community Recovery Principle (called 'CRP')
- the quantity as calculated 7 years after the last application of the pesticide, linked to the Ecological Threshold Principle (called 'ETP')

Using these quantities, the 90th percentiles in space were calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

Persistence output was based on a thickness layer of 0.05 meter

Overall persistence results:

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0000122	0.0000000
7 days	0.0000114	0.0000000
14 days	0.0000109	0.0000000
21 days	0.0000103	0.0000000
28 days	0.0000096	0.0000000
56 days	0.0000079	0.0000000
180 days	0.0000034	0.0000000
365 days	0.0000020	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0009465	0.0000000
7 days	0.0009465	0.0000000
14 days	0.0009417	0.0000000
21 days	0.0009113	0.0000000
28 days	0.0009042	0.0000000
56 days	0.0008771	0.0000000
180 days	0.0008332	0.0000000
365 days	0.0008018	0.0000000

Crop = Maize

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0000122	0.0000000
7 days	0.0000114	0.0000000
14 days	0.0000109	0.0000000
21 days	0.0000103	0.0000000
28 days	0.0000096	0.0000000
56 days	0.0000079	0.0000000
180 days	0.0000034	0.0000000
365 days	0.0000020	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0009465	0.0000000
7 days	0.0009465	0.0000000
14 days	0.0009417	0.0000000
21 days	0.0009113	0.0000000
28 days	0.0009042	0.0000000
56 days	0.0008771	0.0000000
180 days	0.0008332	0.0000000
365 days	0.0008018	0.0000000

GeoPEARL 3.3.3 REPORT: "Assessment 12"

Date: 09/04/2009

General information

Number of plots: 250
 No plot selection was applied

Crop : Maize
 Plot count : 250
 Total area : 2688112.50
 Crop area : 228247.85

Combinations of crops and applications considered in 90th percentile calculation:

Crop : Maize
 Application Interval (a) : 1

Absolute Applications
 Application (Incorporation) at 15-Apr;
 Dosage : 0.48 kg.ha-1

GeoPEARL summary for compound "SdzWC"

Molar mass (g.mol-1) : 250.28
 Saturated vapour pressure (Pa) : 3.13E-7; measured at (C) 20
 Solubility in water (mg.L-1) : 77; measured at (C) 20
 Reference half-life (d) : 28; measured at (C) 20
 Option for Half-life : Input
 Freundlich exponent (-) : 0.9
 Molar enthalpy of sorption (kJ mol-1) : 0
 Freundlich Sorption Option : Kom, pH-independent
 Kom (coef. for sorption on org. matter (L kg-1)) : 46; measured at (C) 20

Summary for leaching

From each run the 20 averaged concentrations from the 20 calculation periods were selected.
 From these 20 values the median value was taken.
 Using this median value the 90th percentile in space was calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

The resulting 90th percentile concentration (ug/L) was: 0.032027

The 90th percentile concentrations of the different crops in the areas of use were:

Crop	Conc. (ug/L)	Area
Maize	0.032027	228971.39

Summary for persistence

For the assessment of persistence in the Dutch pesticide registration procedure the following quantities were calculated:
 - total content of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence
 - pore water concentration of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence.
 The report below describes these two quantities for different time windows for averaging as indicated and for two moments in time that are linked to two protection goals as follows:

- the quantity as calculated 2 years after the last application of the pesticide, linked to the Community Recovery Principle (called 'CRP')
- the quantity as calculated 7 years after the last application of the pesticide, linked to the Ecological Threshold Principle (called 'ETP')

Using these quantities, the 90th percentiles in space were calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

Persistence output was based on a thickness layer of 0.05 meter

Overall persistence results:

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0000723	0.0000000
7 days	0.0000693	0.0000000
14 days	0.0000663	0.0000000
21 days	0.0000633	0.0000000
28 days	0.0000607	0.0000000
56 days	0.0000511	0.0000000
180 days	0.0000259	0.0000000
365 days	0.0000148	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0097922	0.0000000
7 days	0.0096403	0.0000000
14 days	0.0088638	0.0000000
21 days	0.0086403	0.0000000
28 days	0.0079914	0.0000000
56 days	0.0067475	0.0000000
180 days	0.0033333	0.0000000
365 days	0.0019185	0.0000000

Crop = Maize

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0000723	0.0000000
7 days	0.0000693	0.0000000
14 days	0.0000663	0.0000000
21 days	0.0000633	0.0000000
28 days	0.0000607	0.0000000
56 days	0.0000511	0.0000000
180 days	0.0000259	0.0000000
365 days	0.0000148	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0097922	0.0000000
7 days	0.0096403	0.0000000
14 days	0.0088638	0.0000000
21 days	0.0086403	0.0000000
28 days	0.0079914	0.0000000
56 days	0.0067475	0.0000000
180 days	0.0033333	0.0000000
365 days	0.0019185	0.0000000

GeoPEARL 3.3.3 REPORT: "Assessment13d"

Date: 28/08/2009

General information

Number of plots: 250
 No plot selection was applied

Crop : Maize
 Plot count : 250
 Total area : 2688112.50
 Crop area : 228247.85

Combinations of crops and applications considered in 90th percentile calculation:

Crop : Maize
 Application Interval (a) : 1

Absolute Applications

Application (Incorporation) at 15-Apr;
 Dosage : 0.17 kg.ha-1

GeoPEARL summary for compound "TriRc"

Molar mass (g.mol-1) : 290.32
 Saturated vapour pressure (Pa) : 1.32E-6; measured at (C) 20
 Solubility in water (mg.L-1) : 400; measured at (C) 20
 Reference half-life (d) : 100; measured at (C) 20
 Option for Half-life : Input
 Freundlich exponent (-) : 0.9
 Molar enthalpy of sorption (kJ mol-1) : 0
 Freundlich Sorption Option : Kom, pH-independent
 Kom (coef. for sorption on org. matter (L kg-1)) : 70.11; measured at (C) 20

Summary for leaching

From each run the 20 averaged concentrations from the 20 calculation periods were selected.
 From these 20 values the median value was taken.
 Using this median value the 90th percentile in space was calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

The resulting 90th percentile concentration (ug/L) was: 0.635536

The 90th percentile concentrations of the different crops in the areas of use were:

Crop	Conc. (ug/L)	Area
Maize	0.635536	228971.39

Summary for persistence

For the assessment of persistence in the Dutch pesticide registration procedure the following quantities were calculated:

- total content of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence
- pore water concentration of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence.

The report below describes these two quantities for different time windows for averaging as indicated and for two moments in time that are linked to two protection goals as follows:

- the quantity as calculated 2 years after the last application of the pesticide, linked to the Community Recovery Principle (called 'CRP')
- the quantity as calculated 7 years after the last application of the pesticide, linked to the Ecological Threshold Principle (called 'ETP')

Using these quantities, the 90th percentiles in space were calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

Persistence output was based on a thickness layer of 0.05 meter

Overall persistence results:

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0080907	0.0000204
7 days	0.0079690	0.0000203
14 days	0.0078254	0.0000201
21 days	0.0076946	0.0000198
28 days	0.0075717	0.0000198
56 days	0.0071469	0.0000188
180 days	0.0056361	0.0000148
365 days	0.0043068	0.0000109

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.8660787	0.0016199
7 days	0.8540008	0.0016096
14 days	0.8340051	0.0016045
21 days	0.8160068	0.0016013
28 days	0.8010076	0.0015874
56 days	0.7437191	0.0015334
180 days	0.5764626	0.0011555
365 days	0.4283580	0.0009638

Crop = Maize

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0080907	0.0000204
7 days	0.0079690	0.0000203
14 days	0.0078254	0.0000201
21 days	0.0076946	0.0000198
28 days	0.0075717	0.0000198
56 days	0.0071469	0.0000188
180 days	0.0056361	0.0000148
365 days	0.0043068	0.0000109

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.8660787	0.0016199
7 days	0.8540008	0.0016096
14 days	0.8340051	0.0016045
21 days	0.8160068	0.0016013
28 days	0.8010076	0.0015874
56 days	0.7437191	0.0015334
180 days	0.5764626	0.0011555
365 days	0.4283580	0.0009638

GeoPEARL 3.3.3 REPORT: "Assessment15"

Date: 09/04/2009

General information

Number of plots: 250
 No plot selection was applied

Crop : Maize
 Plot count : 250
 Total area : 2688112.50
 Crop area : 228247.85

Combinations of crops and applications considered in 90th percentile calculation:

Crop : Maize
 Application Interval (a) : 1

Absolute Applications

Application (Incorporation) at 15-Apr;
 Dosage : 0.6 kg.ha-1

GeoPEARL summary for compound "Oxy"

Molar mass (g.mol-1) : 460.44
 Saturated vapour pressure (Pa) : 1.29E-22; measured at (C) 20
 Solubility in water (mg.L-1) : 550; measured at (C) 20
 Reference half-life (d) : 28.2; measured at (C) 20
 Option for Half-life : Input
 Freundlich exponent (-) : 0.9
 Molar enthalpy of sorption (kJ mol-1) : 0
 Freundlich Sorption Option : Kom, pH-independent
 Kom (coef. for sorption on org. matter (L kg-1)) : 27321; measured at (C) 20

Summary for leaching

From each run the 20 averaged concentrations from the 20 calculation periods were selected.
 From these 20 values the median value was taken.
 Using this median value the 90th percentile in space was calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

The resulting 90th percentile concentration (ug/L) was: 0.000000

The 90th percentile concentrations of the different crops in the areas of use were:

Crop	Conc. (ug/L)	Area
Maize	0.000000	228971.39

Summary for persistence

For the assessment of persistence in the Dutch pesticide registration procedure the following quantities were calculated:

- total content of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence
- pore water concentration of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence.

The report below describes these two quantities for different time windows for averaging as indicated and for two moments in time that are linked to two protection goals as follows:

- the quantity as calculated 2 years after the last application of the pesticide, linked to the Community Recovery Principle (called 'CRP')
- the quantity as calculated 7 years after the last application of the pesticide, linked to the Ecological Threshold Principle (called 'ETP')

Using these quantities, the 90th percentiles in space were calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

Persistence output was based on a thickness layer of 0.05 meter

Overall persistence results:

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0002311	0.0000000
7 days	0.0002227	0.0000000
14 days	0.0002137	0.0000000
21 days	0.0002051	0.0000000
28 days	0.0001971	0.0000000
56 days	0.0001683	0.0000000
180 days	0.0000876	0.0000000
365 days	0.0000496	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Crop = Maize

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0002311	0.0000000
7 days	0.0002227	0.0000000
14 days	0.0002137	0.0000000
21 days	0.0002051	0.0000000
28 days	0.0001971	0.0000000
56 days	0.0001683	0.0000000
180 days	0.0000876	0.0000000
365 days	0.0000496	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

GeoPEARL 3.3.3 REPORT: "Assessment16"

Date: 10/04/2009

General information

Number of plots: 250
 No plot selection was applied

Crop : Maize
 Plot count : 250
 Total area : 2688112.50
 Crop area : 228247.85

Combinations of crops and applications considered in 90th percentile calculation:

Crop : Maize
 Application Interval (a) : 1

Absolute Applications
 Application (Incorporation) at 15-Apr;
 Dosage : 0.62 kg.ha-1

GeoPEARL summary for compound "Sulf"

Molar mass (g.mol-1) : 253.28
 Saturated vapour pressure (Pa) : 2.49E-7; measured at (C) 20
 Solubility in water (mg.L-1) : 420; measured at (C) 20
 Reference half-life (d) : 2; measured at (C) 20
 Option for Half-life : Input
 Freundlich exponent (-) : 0.9
 Molar enthalpy of sorption (kJ mol-1) : 0
 Freundlich Sorption Option : Kom, pH-independent
 Kom (coef. for sorption on org. matter (L kg-1)) : 103.17; measured at (C) 20

Summary for leaching

From each run the 20 averaged concentrations from the 20 calculation periods were selected.
 From these 20 values the median value was taken.
 Using this median value the 90th percentile in space was calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

The resulting 90th percentile concentration (ug/L) was: 0.000000

The 90th percentile concentrations of the different crops in the areas of use were:

Crop	Conc. (ug/L)	Area
Maize	0.000000	228971.39

Summary for persistence

For the assessment of persistence in the Dutch pesticide registration procedure the following quantities were calculated:
 - total content of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence
 - pore water concentration of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence.
 The report below describes these two quantities for different time windows for averaging as indicated and for two moments in time that are linked to two protection goals as follows:

- the quantity as calculated 2 years after the last application of the pesticide, linked to the Community Recovery Principle (called 'CRP')
- the quantity as calculated 7 years after the last application of the pesticide, linked to the Ecological Threshold Principle (called 'ETP')

Using these quantities, the 90th percentiles in space were calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

Persistence output was based on a thickness layer of 0.05 meter

Overall persistence results:

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Crop = Maize

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

GeoPEARL 3.3.3 REPORT: "Assessment17"

Date: 17/04/2009

General information

Number of plots: 250
 No plot selection was applied

Crop : Maize
 Plot count : 250
 Total area : 2688112.50
 Crop area : 228247.85

Combinations of crops and applications considered in 90th percentile calculation:

Crop : Maize
 Application Interval (a) : 1

Absolute Applications
 Application (Incorporation) at 15-Apr;
 Dosage : 0.36 kg.ha-1

GeoPEARL summary for compound "Sdz"

Molar mass (g.mol-1) : 250.28
 Saturated vapour pressure (Pa) : 3.13E-7; measured at (C) 20
 Solubility in water (mg.L-1) : 77; measured at (C) 20
 Reference half-life (d) : 1.6; measured at (C) 20
 Option for Half-life : Input
 Freundlich exponent (-) : 0.9
 Molar enthalpy of sorption (kJ mol-1) : 0
 Freundlich Sorption Option : Kom, pH-independent
 Kom (coef. for sorption on org. matter (L kg-1)) : 46; measured at (C) 20

Summary for leaching

From each run the 20 averaged concentrations from the 20 calculation periods were selected.
 From these 20 values the median value was taken.
 Using this median value the 90th percentile in space was calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

The resulting 90th percentile concentration (ug/L) was: 0.000000

The 90th percentile concentrations of the different crops in the areas of use were:

Crop	Conc. (ug/L)	Area
Maize	0.000000	228971.39

Summary for persistence

For the assessment of persistence in the Dutch pesticide registration procedure the following quantities were calculated:

- total content of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence
- pore water concentration of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence.

The report below describes these two quantities for different time windows for averaging as indicated and for two moments in time that are linked to two protection goals as follows:

- the quantity as calculated 2 years after the last application of the pesticide, linked to the Community Recovery Principle (called 'CRP')
- the quantity as calculated 7 years after the last application of the pesticide, linked to the Ecological Threshold Principle (called 'ETP')

Using these quantities, the 90th percentiles in space were calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

Persistence output was based on a thickness layer of 0.05 meter

Overall persistence results:

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Crop = Maize

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

GeoPEARL 3.3.3 REPORT: "Assessment18"

Date: 18/04/2009

General information

Number of plots: 250
 No plot selection was applied

Crop : Maize
 Plot count : 250
 Total area : 2688112.50
 Crop area : 228247.85

Combinations of crops and applications considered in 90th percentile calculation:

Crop : Maize
 Application Interval (a) : 1

Absolute Applications
 Application (Incorporation) at 15-Apr;
 Dosage : 0.12 kg.ha-1

GeoPEARL summary for compound "Tri"

Molar mass (g.mol-1) : 290.32
 Saturated vapour pressure (Pa) : 1.32E-6; measured at (C) 20
 Solubility in water (mg.L-1) : 400; measured at (C) 20
 Reference half-life (d) : 51; measured at (C) 20
 Option for Half-life : Input
 Freundlich exponent (-) : 0.9
 Molar enthalpy of sorption (kJ mol-1) : 0
 Freundlich Sorption Option : Kom, pH-independent
 Kom (coef. for sorption on org. matter (L kg-1)) : 70.11; measured at (C) 20

Summary for leaching

From each run the 20 averaged concentrations from the 20 calculation periods were selected.
 From these 20 values the median value was taken.
 Using this median value the 90th percentile in space was calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

The resulting 90th percentile concentration (ug/L) was: 0.018740

The 90th percentile concentrations of the different crops in the areas of use were:

Crop	Conc. (ug/L)	Area
Maize	0.018740	228971.39

Summary for persistence

For the assessment of persistence in the Dutch pesticide registration procedure the following quantities were calculated:
 - total content of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence
 - pore water concentration of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence.
 The report below describes these two quantities for different time windows for averaging as indicated and for two moments in time that are linked to two protection goals as follows:

- the quantity as calculated 2 years after the last application of the pesticide, linked to the Community Recovery Principle (called 'CRP')
- the quantity as calculated 7 years after the last application of the pesticide, linked to the Ecological Threshold Principle (called 'ETP')

Using these quantities, the 90th percentiles in space were calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

Persistence output was based on a thickness layer of 0.05 meter

Overall persistence results:

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0006544	0.0000000
7 days	0.0006404	0.0000000
14 days	0.0006253	0.0000000
21 days	0.0006108	0.0000000
28 days	0.0005952	0.0000000
56 days	0.0005391	0.0000000
180 days	0.0003432	0.0000000
365 days	0.0002220	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0652729	0.0000000
7 days	0.0642114	0.0000000
14 days	0.0622114	0.0000000
21 days	0.0602114	0.0000000
28 days	0.0576581	0.0000000
56 days	0.0522114	0.0000000
180 days	0.0319506	0.0000000
365 days	0.0203915	0.0000000

Crop = Maize

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0006544	0.0000000
7 days	0.0006404	0.0000000
14 days	0.0006253	0.0000000
21 days	0.0006108	0.0000000
28 days	0.0005952	0.0000000
56 days	0.0005391	0.0000000
180 days	0.0003432	0.0000000
365 days	0.0002220	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0652729	0.0000000
7 days	0.0642114	0.0000000
14 days	0.0622114	0.0000000
21 days	0.0602114	0.0000000
28 days	0.0576581	0.0000000
56 days	0.0522114	0.0000000
180 days	0.0319506	0.0000000
365 days	0.0203915	0.0000000

GeoPEARL 3.3.3 REPORT: "Assessment19"

Date: 15/04/2009

General information

Number of plots: 250
 No plot selection was applied

Crop : Maize
 Plot count : 250
 Total area : 2688112.50
 Crop area : 228247.85

Combinations of crops and applications considered in 90th percentile calculation:

Crop : Maize
 Application Interval (a) : 1

Absolute Applications

Application (Injection) at 15-Apr;
 Dosage : 0.6 kg.ha-1

GeoPEARL summary for compound "Oxy"

Molar mass (g.mol-1) : 460.44
 Saturated vapour pressure (Pa) : 1.29E-22; measured at (C) 20
 Solubility in water (mg.L-1) : 550; measured at (C) 20
 Reference half-life (d) : 28.2; measured at (C) 20
 Option for Half-life : Input
 Freundlich exponent (-) : 0.9
 Molar enthalpy of sorption (kJ mol-1) : 0
 Freundlich Sorption Option : Kom, pH-independent
 Kom (coef. for sorption on org. matter (L kg-1)) : 27321; measured at (C) 20

Summary for leaching

From each run the 20 averaged concentrations from the 20 calculation periods were selected.
 From these 20 values the median value was taken.
 Using this median value the 90th percentile in space was calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

The resulting 90th percentile concentration (ug/L) was: 0.000000

The 90th percentile concentrations of the different crops in the areas of use were:

Crop	Conc. (ug/L)	Area
Maize	0.000000	228971.39

Summary for persistence

For the assessment of persistence in the Dutch pesticide registration procedure the following quantities were calculated:

- total content of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence
- pore water concentration of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence.

The report below describes these two quantities for different time windows for averaging as indicated and for two moments in time that are linked to two protection goals as follows:

- the quantity as calculated 2 years after the last application of the pesticide, linked to the Community Recovery Principle (called 'CRP')
- the quantity as calculated 7 years after the last application of the pesticide, linked to the Ecological Threshold Principle (called 'ETP')

Using these quantities, the 90th percentiles in space were calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

Persistence output was based on a thickness layer of 0.05 meter

Overall persistence results:

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0002307	0.0000000
7 days	0.0002221	0.0000000
14 days	0.0002131	0.0000000
21 days	0.0002047	0.0000000
28 days	0.0001967	0.0000000
56 days	0.0001681	0.0000000
180 days	0.0000873	0.0000000
365 days	0.0000492	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Crop = Maize

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0002307	0.0000000
7 days	0.0002221	0.0000000
14 days	0.0002131	0.0000000
21 days	0.0002047	0.0000000
28 days	0.0001967	0.0000000
56 days	0.0001681	0.0000000
180 days	0.0000873	0.0000000
365 days	0.0000492	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

GeoPEARL 3.3.3 REPORT: "Assessment20"

Date: 16/04/2009

General information

Number of plots: 250
 No plot selection was applied

Crop : Maize
 Plot count : 250
 Total area : 2688112.50
 Crop area : 228247.85

Combinations of crops and applications considered in 90th percentile calculation:

Crop : Maize
 Application Interval (a) : 1

Absolute Applications
 Application (Injection) at 15-Apr;
 Dosage : 0.62 kg.ha-1

GeoPEARL summary for compound "Sulf"

Molar mass (g.mol-1) : 253.28
 Saturated vapour pressure (Pa) : 2.49E-7; measured at (C) 20
 Solubility in water (mg.L-1) : 420; measured at (C) 20
 Reference half-life (d) : 2; measured at (C) 20
 Option for Half-life : Input
 Freundlich exponent (-) : 0.9
 Molar enthalpy of sorption (kJ mol-1) : 0
 Freundlich Sorption Option : Kom, pH-independent
 Kom (coef. for sorption on org. matter (L kg-1)) : 103.17; measured at (C) 20

Summary for leaching

From each run the 20 averaged concentrations from the 20 calculation periods were selected.
 From these 20 values the median value was taken.
 Using this median value the 90th percentile in space was calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

The resulting 90th percentile concentration (ug/L) was: 0.000000

The 90th percentile concentrations of the different crops in the areas of use were:

Crop	Conc. (ug/L)	Area
Maize	0.000000	228971.39

Summary for persistence

For the assessment of persistence in the Dutch pesticide registration procedure the following quantities were calculated:

- total content of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence
- pore water concentration of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence.

The report below describes these two quantities for different time windows for averaging as indicated and for two moments in time that are linked to two protection goals as follows:

- the quantity as calculated 2 years after the last application of the pesticide, linked to the Community Recovery Principle (called 'CRP')
- the quantity as calculated 7 years after the last application of the pesticide, linked to the Ecological Threshold Principle (called 'ETP')

Using these quantities, the 90th percentiles in space were calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

Persistence output was based on a thickness layer of 0.05 meter

Overall persistence results:

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Crop = Maize

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

GeoPEARL 3.3.3 REPORT: "Assessment21"

Date: 16/04/2009

General information

Number of plots: 250
 No plot selection was applied

Crop : Maize
 Plot count : 250
 Total area : 2688112.50
 Crop area : 228247.85

Combinations of crops and applications considered in 90th percentile calculation:

Crop : Maize
 Application Interval (a) : 1

Absolute Applications
 Application (Injection) at 15-Apr;
 Dosage : 0.36 kg.ha-1

GeoPEARL summary for compound "Sdz"

Molar mass (g.mol-1) : 250.28
 Saturated vapour pressure (Pa) : 3.13E-7; measured at (C) 20
 Solubility in water (mg.L-1) : 77; measured at (C) 20
 Reference half-life (d) : 1.6; measured at (C) 20
 Option for Half-life : Input
 Freundlich exponent (-) : 0.9
 Molar enthalpy of sorption (kJ mol-1) : 0
 Freundlich Sorption Option : Kom, pH-independent
 Kom (coef. for sorption on org. matter (L kg-1)) : 46; measured at (C) 20

Summary for leaching

From each run the 20 averaged concentrations from the 20 calculation periods were selected.
 From these 20 values the median value was taken.
 Using this median value the 90th percentile in space was calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

The resulting 90th percentile concentration (ug/L) was: 0.000000

The 90th percentile concentrations of the different crops in the areas of use were:

Crop	Conc. (ug/L)	Area
Maize	0.000000	228971.39

Summary for persistence

For the assessment of persistence in the Dutch pesticide registration procedure the following quantities were calculated:

- total content of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence
- pore water concentration of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence.

The report below describes these two quantities for different time windows for averaging as indicated and for two moments in time that are linked to two protection goals as follows:

- the quantity as calculated 2 years after the last application of the pesticide, linked to the Community Recovery Principle (called 'CRP')
- the quantity as calculated 7 years after the last application of the pesticide, linked to the Ecological Threshold Principle (called 'ETP')

Using these quantities, the 90th percentiles in space were calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

Persistence output was based on a thickness layer of 0.05 meter

Overall persistence results:

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Crop = Maize

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0000000	0.0000000
7 days	0.0000000	0.0000000
14 days	0.0000000	0.0000000
21 days	0.0000000	0.0000000
28 days	0.0000000	0.0000000
56 days	0.0000000	0.0000000
180 days	0.0000000	0.0000000
365 days	0.0000000	0.0000000

GeoPEARL 3.3.3 REPORT: "Assessment22"

Date: 17/04/2009

General information

Number of plots: 250
 No plot selection was applied

Crop : Maize
 Plot count : 250
 Total area : 2688112.50
 Crop area : 228247.85

Combinations of crops and applications considered in 90th percentile calculation:

Crop : Maize
 Application Interval (a) : 1

Absolute Applications
 Application (Injection) at 15-Apr;
 Dosage : 0.12 kg,ha-1

GeoPEARL summary for compound "Tri"

Molar mass (g.mol-1) : 290.32
 Saturated vapour pressure (Pa) : 1.32E-6; measured at (C) 20
 Solubility in water (mg.L-1) : 400; measured at (C) 20
 Reference half-life (d) : 51; measured at (C) 20
 Option for Half-life : Input
 Freundlich exponent (-) : 0.9
 Molar enthalpy of sorption (kJ mol-1) : 0
 Freundlich Sorption Option : Kom, pH-independent
 Kom (coef. for sorption on org. matter (L kg-1)) : 70.11; measured at (C) 20

Summary for leaching

From each run the 20 averaged concentrations from the 20 calculation periods were selected.
 From these 20 values the median value was taken.
 Using this median value the 90th percentile in space was calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

The resulting 90th percentile concentration (ug/L) was: 0.019086

The 90th percentile concentrations of the different crops in the areas of use were:

Crop	Conc. (ug/L)	Area
Maize	0.019086	228971.39

Summary for persistence

For the assessment of persistence in the Dutch pesticide registration procedure the following quantities were calculated:

- total content of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence
- pore water concentration of substance averaged over the top layer used for evaluation of persistence.

The report below describes these two quantities for different time windows for averaging as indicated and for two moments in time that are linked to two protection goals as follows:

- the quantity as calculated 2 years after the last application of the pesticide, linked to the Community Recovery Principle (called 'CRP')
- the quantity as calculated 7 years after the last application of the pesticide, linked to the Ecological Threshold Principle (called 'ETP')

Using these quantities, the 90th percentiles in space were calculated for the whole area of use. In the procedure each concentration was weighed by its surface area.

Persistence output was based on a thickness layer of 0.05 meter

Overall persistence results:

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0006126	0.0000000
7 days	0.0005957	0.0000000
14 days	0.0005821	0.0000000
21 days	0.0005667	0.0000000
28 days	0.0005517	0.0000000
56 days	0.0004948	0.0000000
180 days	0.0003295	0.0000000
365 days	0.0002151	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0652729	0.0000000
7 days	0.0642114	0.0000000
14 days	0.0622114	0.0000000
21 days	0.0602114	0.0000000
28 days	0.0576581	0.0000000
56 days	0.0522114	0.0000000
180 days	0.0319506	0.0000000
365 days	0.0203915	0.0000000

Crop = Maize

Time weighted average content (mg/kg) in top layer

Time window	CRP (mg/kg)	ETP (mg/kg)
0 days	0.0006126	0.0000000
7 days	0.0005957	0.0000000
14 days	0.0005821	0.0000000
21 days	0.0005667	0.0000000
28 days	0.0005517	0.0000000
56 days	0.0004948	0.0000000
180 days	0.0003295	0.0000000
365 days	0.0002151	0.0000000

Time weighted average pore water concentration (ug/L) in top layer

Time window	CRP (ug/L)	ETP (ug/L)
0 days	0.0652729	0.0000000
7 days	0.0642114	0.0000000
14 days	0.0622114	0.0000000
21 days	0.0602114	0.0000000
28 days	0.0576581	0.0000000
56 days	0.0522114	0.0000000
180 days	0.0319506	0.0000000
365 days	0.0203915	0.0000000